



INFORMATIONS MEDICALES AVANT REALISATION D'UN DRAINAGE POUR UN ADENO-PHLEGMON CERVICAL CHEZ L'ENFANT

Madame, Monsieur,
Vous-même ou votre enfant présentez une tuméfaction latéro-cervicale inflammatoire, consécutive à une infection de votre gorge, qui ne se résorbe pas sous traitement médical.

Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Votre chirurgien est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

N'oubliez pas de dire au chirurgien les traitements que votre enfant prend régulièrement, et en particulier l'aspirine. N'oubliez pas de signaler si votre enfant a déjà présenté des manifestations allergiques, en particulier médicamenteuses. Enfin n'oubliez pas d'apporter, lors de l'hospitalisation, les documents médicaux en votre possession : prises de sang, examens radiologiques notamment.

BUT DE L'INTERVENTION

Le but de l'intervention est d'aborder chirurgicalement la tuméfaction pour inciser, faire des prélèvements (bactériologiques, histologiques) et drainer la collection abcédée. Ce geste est nécessaire pour éviter des complications potentielles à type de fistulisation à la peau, dissémination de l'infection, voire des complications graves à type de rupture vasculaire.

REALISATION DE L'INTERVENTION

L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Une consultation d'anesthésie pré-opératoire est indispensable. Il est de la compétence du médecin-anesthésiste-réanimateur, que vous verrez en consultation préalable à l'intervention, de répondre à vos questions relatives à sa spécialité.

L'incision cutanée s'effectue en regard de la tuméfaction. On incise la poche de l'abcès, on effectue les prélèvements, on débride la collection purulente, on effectue un lavage. Un système de drainage et/ou irrigation sera, en règle, mis en place. Il sera maintenu pendant quelques jours.

Les soins post-opératoires et la durée de l'hospitalisation vous seront précisés par votre chirurgien.

RISQUES IMMEDIATS

Une hémorragie est possible ; elle est rare mais peut, dans certains cas, nécessiter un geste chirurgical d'hémostase.

RISQUES SECONDAIRES

En dehors de la cicatrice qui peut être fibreuse ou épaisse, douloureuse, disgracieuse, on peut observer des zones d'anesthésie au niveau de votre cou.

Selon la localisation de la tuméfaction, on peut observer une atteinte du nerf qui innerve les muscles de la région du menton.

Enfin, en cas de collection volumineuse, ou d'infection particulièrement tenace malgré le traitement médical associé au drainage, on peut observer une récurrence de l'abcès qui nécessite alors un nouveau drainage.

COMPLICATIONS GRAVES ET/OU EXCEPTIONNELLES

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

L'hémorragie cataclysmique par rupture des gros vaisseaux est une éventualité rarissime, le plus souvent liée au processus infectieux qui a nécrosé les parois vasculaires.

Une infection extensive à la région cervico-faciale (cellulite) ou la dissémination du processus infectieux avec septicémie sont, en règle, liées à la pathologie causale ou au germe responsable de l'infection. Ces complications nécessitent un traitement médical approprié, éventuellement en milieu spécialisé.

